

Ibutanmigra[®]

Ibuprofeno / Cafeína / Dihidroergotamina mesilato Tableta

Composición:

Cada Tableta contiene Ibuprofeno 400 mg, Cafeína 40,00 mg, Dihidroergotamina Mesilato 1,00 mg, Excipientes c.s.

Vía de Administración:

Oral.

Indicaciones:

Tratamiento de la cefalea de tipo vascular.

Posología:

Dos (2) tabletas inicialmente, si el dolor persiste tomar una (1) tableta cada 6 horas. Dosis máxima: 5 tabletas cada 24 horas

Advertencias:

No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable. No se administre durante la lactancia a menos que el médico lo indique.

Debido al potencial arritmogénico de la cafeína, se debe evitar el uso en pacientes con arritmias cardíacas sintomáticas y/o palpitaciones y posterior a un infarto al miocardio. Debe disminuirse el consumo de café, té y/o bebidas que contengan cafeína con la administración de este producto.

“Manténgase fuera del alcance de los niños”. No exceda la dosis prescrita.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, o a otros antiinflamatorios no esteroideos, sangramiento gastrointestinal, úlcera gastroduodenal activa, y pacientes con alteraciones de la

coagulación y/o tratamiento con anticoagulantes.

Precauciones:

Insuficiencia hepática y/o renal crónica, pacientes con antecedentes de discrasias sanguíneas, úlcera péptica o hemorrágicas gastrointestinales, asma bronquial, hipertensión arterial, trastornos auditivos y visuales.

Interacciones:

Acido acetilsalicílico y otros AINES, ciprofibrato, baclofén, teofilina, macrólidos, sumatriptán, bromocriptina, anticoagulantes, sales de litio, antihipertensivos, diuréticos

Reacciones Adversas:

Gastrointestinales: Náusea, vómito, epigastralgia, indigestión, diarrea, dolor abdominal.

Cardíacas: Palpitaciones, taquicardia, alteraciones del ritmo.

Neurológicas: Cefalea, mareos, somnolencia, visión borrosa, insomnio, intranquilidad e irritabilidad.

Psicológicas: La ingesta prolongada de cafeína puede producir tolerancia, habituación y dependencia psicológica.

Dermatológicas: Erupción cutánea, edema.

Otras: Con dosis altas de ibuprofeno y durante tiempo prolongado se han informado casos de trastornos hematológicos, hepato-toxicidad, ulceración hemorragia gastrointestinal, ambliopía tóxica, trastornos de la visión de colores, disminución de la audición y trastornos renales.

Manifestaciones de vasoconstricción periférica, aumento transitorio de las transaminasas, palpitaciones.

Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura menor de 30° C.

Presentaciones:

Estuche blíster con 10 ó 20 Tabletas.

Venta con prescripción facultativa.

Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° E.F.: 40.536/21.

Elaborado y distribuido por **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.** Caracas-Venezuela.

RIF: J-00025208-4.

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-IGUALES/0800-4482537.

