

Nonafol[®]

Acido Fólico 10 mg / mL

Solución Oral Gotas

Vía de Administración: Oral.

Composición: Cada 1 mL (20 gotas) contiene Acido fólico 10 mg, sacarina sódica 10 mg, sorbitol 70% 200 mg, vehículo hidroglicérico c.s.p. 1 mL.

Indicaciones: En anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. En tratamientos con quimioterápicos no antagonistas de los folatos. Tratamiento preventivo de la malformación del eje neural.

Posología: Tratamiento de la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Adultos y niños: 5-10 mg/día. Dosis máxima: 15 mg/día.

En tratamiento con quimioterápicos no antagonistas de los folatos. Adultos: 5-10 mg/día. Dosis máxima: 15 mg/día.

Tratamiento preventivo de la malformación del eje neural. Dosis: 5 mg al día.

Modo de Uso: Ingerir con un poco de agua, después o en el intervalo entre comidas. La duración del tratamiento debe ser establecida por el médico.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No exceda la dosis prescrita. Su administración no excluye una dieta balanceada. El diagnóstico diferencial de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, tratada con ácido fólico o mixtas es perentoria, ya que conlleva a complicaciones severas e irreversibles en la esfera neurológica. El tratamiento con antianémico debe ser prolongado. El ácido fólico no debe administrarse en caso de anemia cuya etiología sea desconocida, dado el riesgo de enmascaramiento de un cuadro de anemia perniciosa. "Manténgase fuera del alcance de los niños".

Precauciones: Durante el tratamiento deben realizarse los controles de laboratorio hasta la normalidad de los valores hematológicos. El Ácido Fólico puede mejorar el cuadro hemático de la anemia perniciosa, pero es ineficaz en lesiones asociadas al tejido epitelial y nervioso, por lo que, debe administrarse conjuntamente con la vitamina B12. El ácido fólico puede utilizarse con seguridad durante el embarazo y la lactancia. La deficiencia de ácido fólico durante el embarazo es un problema común en mujeres malnutridas y que no reciben suplementación. Se ha demostrado que la deficiencia de ácido fólico da lugar a anomalías congénitas, defectos del tubo neural, abortos espontáneos y otras complicaciones. Por ello, la mujer embarazada debe recibir cantidades suficientes de ácido fólico en la dieta o mediante suplementación. El ácido fólico se excreta en la leche materna. Durante la lactancia los requerimientos de ácido fólico están aumentados. El consumo de ácido fólico es compatible con la lactancia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al Ácido Fólico. Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Anemia por deficiencia de vitamina B12.

Interacciones: El Ácido Fólico puede presentar interacciones con corticosteroides (uso prolongado), analgésicos, estrógenos, fenitoína, antibióticos, metotrexato, trimetoprim, sulfamidas, cloranfenicol y alcohol.

Sobredosis: A dosis usuales, el ácido fólico es bien tolerado por el organismo, no existiendo la posibilidad de intoxicación aguda, crónica ó accidental. No se han notificado casos de sobredosis. Cuando se administran dosis elevadas, el ácido fólico se elimina en la orina.

Reacciones adversas: Las reacciones adversas se han clasificado por su frecuencia en: Muy frecuentes (mayor o igual que 1/10). Frecuentes (mayor o igual que 1/100, Menor que 1/10). Poco frecuentes (mayor o igual que 1/1000, menor que 1/100). Raras (mayor o igual que 1/10.000, menor que 1/1000). Muy raras (menor que 1/10.000). Frecuencia no conocida (notificadas durante el uso post-comercialización en datos de laboratorio). Trastornos del sistema inmunológico: Raras: Fenómenos de hipersensibilidad, como eritema, fiebre, prurito y broncospasmo. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Raras: Fiebre.

Presentación: Ácido Fólico 10 mg/mL Solución Gotas en frasco conteniendo 15 mL. E.F. 42.092/18

Conservación del Producto: Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30°C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y Distribuido por: Meyer Productos Terapéuticos, S.A.

RIF. J-00025208-4. Caracas-Venezuela.

Para información y reclamos favor comunicarse al 0800-GUALES / 08004482537

