

Sigtiphin[®]

Flavoxato HCL 200 mg

Comprimidos recubiertos

Indicaciones: Tratamiento sintomático de dolor tipo cólico de las vías urinarias.

Posología: 200 mg cada 8 horas.

Modo de empleo: El medicamento debe ser ingerido entero con un poco de agua, en caso de observar intolerancia gástrica, se recomienda la ingesta de flavoxato con las comidas (desayuno, almuerzo y cena).

Advertencias: En pacientes con infección concomitante de las vías genitourinarias, debe asociarse un tratamiento con antimicrobianos adecuados. En los pacientes con síntomas vesicales crónicos, puede ser necesario un tratamiento de mantenimiento durante períodos prolongados para obtener resultados óptimos. Al mejorar los síntomas, se puede reducir la dosis. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia mientras dure el tratamiento.

Precauciones: En conductores de vehículos o que operen maquinarias o realicen trabajo de precisión, por la posibilidad de aparición de efectos secundarios como: somnolencia, visión borrosa y vértigo. En pacientes con insuficiencia renal y/o hepática, glaucoma.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al flavoxato y otros componentes de la fórmula. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche de su existencia. Obstrucción pilórica o duodenal, íleo paralítico, obstrucción urinaria, hipertrofia prostática y acalasia. Glaucoma de ángulo estrecho. Megacolon tóxico, colitis ulcerosa y hemorragia gastrointestinal. Menores de 12 años.

Reacciones adversas:

Gastrointestinal: Nauseas, vómito, dispepsia, disfagia, boca seca.

Oftalmológicas: Alteraciones visuales y de acomodación, aumento de la presión intraocular, visión borrosa.

Sistema Nervioso Central: Cefalea, nerviosismo, somnolencia, mareo, confusión mental (ancianos).

Cardiovascular: Taquicardia, palpitaciones.

Dermatológicas: Angioedema, urticaria, prurito.

Otros: Leucopenia, eosinofilia.

Interacciones: Estimulantes del SNC, antidepresivos tricíclicos o IMAO.

Sobredosificación

Tratamiento: A los pacientes que hayan tomado una sobredosis de Flavoxato debe practicarse un lavado gástrico dentro de las 4 horas siguientes a la ingestión. Si la sobredosificación es extrema o si se retrasa la eliminación del medicamento del estómago debe considerarse la administración de un parasimpaticomimético. En caso necesario, debe efectuarse hospitalización e instalación de medidas de soporte vital.

Presentaciones:

Envase blíster con 10 y/ó 20 Comprimidos Recubiertos. E.F.40.539/21

Conservación del Producto: Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30°C. No emplear el producto después de la fecha de expiración indicada en el empaque.

Elaborado y Distribuido por: **Meyer Productos Terapéuticos, S.A.**

RIF: J- 00025208-4 Caracas – Venezuela.

Para información y reclamos favor comunicarse al **0800-IGUALES / 08004482537**

